



KROKPOKROKU VIDEO

PERI-IMPLANTITIS

REGENERACJA WOKÓŁ IMPLANTU

Dr Thomas Liechti, Switzerland

DIAGNOZA




Kieszonka o głębokości 7 mm, BOP+, zakażone tkanki miękkie wokół implantu, ropa po usunięciu korony.

PRZED



CLEAN&SEAL®



Przy każdej aplikacji PERISOLV usuń ziarninę i oczyść mechanicznie, następnie rozpocznij regenerację, wypełniając ubytek usieciowanym żelem hialuronowym.

KONTROLA



6 miesięcy po zabiegu **CLEAN&SEAL®**: Tkanki jędrne, kieszonka 5 mm, z widocznym przyrostem kości wokół implantu, co wskazuje na postęp regeneracji zarówno tkanek miękkich, jak i twardych.

PO



REGENERACJA TKANEK PRZYŻĘBIA

Dr Eglė Ramanauskaitė, Lithuania

DIAGNOZA




Głęboka kieszonka przyzębna (PD > 10 mm). Paradontoza stadium III, stopień B.

PRZED



CLEAN&SEAL®




Wprowadzenie PERISOLV do kieszonek przyzębnych na 60 sekund przed zabiegiem.

Aplikację powtarzać aż do stanu, gdzie podczas płukania nie widać już żadnych pozostałości biofilmu ani ziarniny.

Wprowadzenie usieciowanego kwasu hialuronowego do wszystkich leczonych kieszonek przyzębnych po podziałkowym oczyszczeniu.

KONTROLA



Kieszonka przyzębna 6 miesięcy po zabiegu **CLEAN&SEAL®**: PD 3 mm. Między kontrolami po 3 i 6 miesiącach obserwuje się stopniową poprawę w redukcji głębokości kieszonki.

PO



POBIERZ BADANIA



OSTRA KIESZONKA PRZYŻĘBNA*

- ✓ 99 % wygojonych kieszonek
- ✓ 57 % poprawa głębokości kieszonki (PD)
- ✓ 61 % poprawa przyczepu klinicznego (CAL)
- ✓ 96 % poprawa krwawienia przy zgłębnikowaniu (BOP)

KIESZONKA RESZTKOWA PRZYŻĘBNA**

- ✓ Poprawa przyczepu klinicznego (CAL) o 2 mm
- ✓ 58 % poprawa krwawienia przy zgłębnikowaniu (BOP)
- ✓ Redukcja głębokości kieszonki przyzębnej (PPD) o ~2 mm

* Ramanauskaitė et al. 2023

** Diehl et al. 2022